

Dezinfekční plán
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.



	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka		
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	0,25-0,5%	60-30 min	AB(V)	dáv.k.láhev		
					0,25%	60 min	A(B)(V)			
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,75%	15 min	AB(V)			
					0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev		
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1,5%	60 min	A(B)TM(V)			
					1%	30 min	A(B)(V)			
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev		
					0,50%	15 min	A(B)(V)			
					1,50%	60 min	A(B)TM(V)			
					3,00%	30 min	A(B)TM(V)			
dezinfekce postřikem			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbi/10 l	5 min	A(B)V	TBC 20x/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH		
			INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	i pro lesklé povrchy a nerez		
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)			
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	1 min	A(B)(V)	noro, adeno, SV40		
						2 min	AB(V)			
						5 min	ABTMV	Cl.diff.		
						15 min	ABCTMV			
			dezinfekce otěrem	i UZ sondy,citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	1 min	A(B)TM(V)	
					INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	
					DESTIX MK 75	KAS	neředí se	1 min	A(B)(V)	
SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se			30 min	ABTV				
					15 min	A(B)TV				
					1 min	A(B)(V)				
					1 min	A(B)(V)	adeno, SV40			
INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek			5 min	A(B)TMV	Cl.diff.			
					15 min	A(B)TMV	Cl.diff. + MNV			
					30 min	ABCTMV				
			3 min	A(B)T(V)						
inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	30 sec.	A(B)(V)				
		DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TM(V)				
	omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	60 min	ABTMV				
		TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	15 min	ABCTMV				
		plochy, předměty	omýt roztokem	INCIDIN ACTIVE	peruhličen disodný	2%	60 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory	
				INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	15 min	ABCTM(V)		
INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku			ubrousek	10 min	A(B)TMV + Cl. diff.				
INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS			5 min	A(B)TMV + Cl. diff.					
MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný			2%	60 min	ABTMV + Cl.diff.				
					2tbi/10 l	30 min	ABTMV	TBC 20x/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH		
					1 tbi / 1,5l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.			
					2 tbi / 1,5l vody	15 min	ABTMV + Cl.diff.			
8tbi / 1,5l vody	15 min			ABCTMV						
ruce	virové náky			SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec	ABTM(V)	příné viruscí	
buršičnu smídit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu)	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	6 min	A(B)TM(V)					
	DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	buršičnu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu				
	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tbi/10l vody	30 min	ABTMV					
	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbi/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc				
tbi nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbi/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc			
		GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	1%	15 min	A(B)(V)				
		DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%	15 min	A(B)TM(V)				
		SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	1%	15 min	A(B)(V)				
				1,5%	60 min	A(B)(V)				
				2,5%	30 min	A(B)T(V)				
				4%	15 min	A(B)(V)				
		STABIMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%	15 min	A(B)(V)				
		ANIOSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.				
		SEKUZYME	enzym	0,5%	15 min	-----				
dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zele ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý			
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV				
		KORSOLEX PAA	kyselina peroctová	neředí se	15 min	ABCTMV	denně čerstvý			
		INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V)				
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	60 min	ABTM(V)				
		ANIOSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.				
		Odsávací		ANIOSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.		
				MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbi/10 l	5 min	ABV		
				INCIDIN ACTIVE	peruhličen disodný	1%	5 min	A(V)		
				SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(V)		
rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	Kyselina amidosulfonová		dle doporučení servisních techniků/pracovníků						
		SAVAGRO K		kys. fosforečná		0,25%	30 min	-----	teplicita vody 40-60°C	
		MEDICARINE		dichlorizokyan.sodný		2 tbi/10 l	5 min	A(B)V	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC>30 min	
		DESAM PRIM		chlór		2%	45 min	ABV		
nádobi	očistit, ponořit do roztoku, oplach	DESAM EXTRA	KAS, amin	5%	30 min	ABTMV + Cl. diff.				
				0,5%	15 min	A(B)T				
				1%	15 min	A(B)TV				
mytí rukou	pěnové mýdlo	KIMCARE pěnové mýdlo		neředěné, 4 ml						
		SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	30 sec./2x1,5min	A(B)TM(V)				
		SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)				
		SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec	ABTM(V)				
					20 sec./1,5min	ABTM(V)	pro alergiky			
					30 sec	ABTM(V)				
					30 sec	ABTM(V)				
		SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec. /2x1,5min	A(B)TM(V)				
		SEPTODERM GEL BAG	alkohol							
		SEPTODERM SOFT (BAG)	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec. /2x1,5min	A(B)TM(V)				
		SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec./2x1,5min	ABTM(V)				
		SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	30 sec./2x1,5min	A(B)TM(V)				
		regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	SILONDA						
				SILONDA LIPID, SENSITIVE						
				BALMEA/BALMEA PROTECT						
		dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TM(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min	
				CITROCOREX 2% CLEAR (zelená etiketa)	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)TM(V)	remanentní účinek 6 hodin	
dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)TM(V)	nechat vždy zcela zaschnout			
		Braunodem	alkohol, PVP-Jod	neředí se		A(B)TM(V)				
		CHLORHEXIDIN 2% alcoholic solution barvený	chlorhexidin, alkohol	neředí se	2 min	A(B)(V)	vhodný i na vstupní centrálních žilních katétrů			
Prevence plísni nohou	postřik	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	vhodné pro diabetiky			
katétry	katétry, spojovací hadičky	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	remanentní účinek 24 hodin - použít při katétrech apřikaci			
		CITROCOREX 2% MD (žedá etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TM(V)				
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINSAN SCRUB N / FOAM	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sec	cca 3ml	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pévnová forma pro imobilní pacienty		
						1 min	A(B)(V)			
dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)(V)				
		OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)(V)				
		BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV				

Dezinfekční plán - dodatek
Oblastní nemocnice Jičín a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Ruce	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou)	vetřít do suché pokožky rukou	Sterillium	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	A(B)TM(V)	
			Sterillium classic pure	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	A(B)TM(V)	pro citlivou pokožku
			Sterillium med	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	ABTMV	pro epidemiologicky závažné situace - plně virucidní pro citlivou pokožku
Pokožka	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	Citroclorex RED 2%	chlorhexidin diglukonát, ethanol	neředí se	1 minuta	A(B)(V)	Stabilita barevného roztoku 72 hodiny od namíchání.
			Cutasept G	propanol	neředí se	min. 15 s /poukce 1 min	A(B)T(V)	pokožka s velkým množstvím potních žláz 2 minutv
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	Cutasept F	propanol	neředí se	min. 15 s	A(B)T(V)	
Malé plochy		dezinfekce otěrem	Incidin Alcohol Wipe	propanol	ubrousek	1 min / 5 min	A(B)T(V) / A(B+)T(V)	
Citlivé materiály	inkubátory, akryláty, UZ sondy, citlivé plasty	otřít ubrouskem	Meliseptol Wipes Sensitive	KAS, propanol	ubrousek	1 min	A(B)(V)	
			Sterimed 100	Ethanol, Isopropanol, Benzalkoniumchlorid, Trideceth –7	ubrousek	15 min	A(B+)TMV	
		dezinfekce postříkem	Desprej senzitive	KAS	neředí se	5 min	A(B)TM(V)	Nevhodný na materiály ze silikonu, barevných kovů, gumy, měkčeného PVC a polyamidu.
Nástroj	dekontaminace nástrojů	zcela ponořit do roztoku, umýt a oplach	Aniosyme XL3	KAS, enzymy	0,5% / 1%	15 min / 30 min	A(B)(V) / A(B)T(V)	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem nechat působit, oplach	Incidin Pro	amin, KAS	0,25%	5 min	A(V)	možno i vyšší koncentrace dle dezinfekčního plánu
			Incidin Plus	glukoprotamin	1%	30 min	A(B)V	
Katétry	vstupy infúzních linek	otřít ubrouskem	Softa Cloth CHX 2%	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	ubrousek	15 s	A(V)	

Pro použití s aplikačním systémem Incidin WIPES (suché utěrky)

Plochy	Plochy, nábytek, předměty	otřít ubrouskem	Incidin Rapid	aldehyd, KAS	0,25% / 0,5% / 0,75%	60 / 30 / 30 min	A(B)(V) / A(B)(V) / AB(V)	možno používat 28 dnů
			Incidin Pro	amin, KAS	0,5% / 1%	30 / 15 min	A(B)(V)	možno používat 28 dnů
			Incidin Plus	glukoprotamin	2% / 1% / 3%	15 / 30 / 30 min	A(B)(V) / A(B)(V) / A(B)TM(V)	možno používat 28 dnů
			Incidin liquid	alkohol	neředí se	5 min	A(B)TM(V)	možno používat 28 dnů
			Incidin Foam	glukoprotamin	neředí se	1 min	A(B)V	možno používat 28 dnů

Účinnost: A – baktericidní | (B) – virucidní na obalené viry | (B+) omezeně virucidní |B – plně virucidní | T – tuberculocidní | M – mykobaktericidní | (V) – levurocidní – kvasinky | V - fungicidní

08.08.2022