

Dezinfekční plán
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.



	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umyvadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN RAPID	aldehyd.KAS	0,25-0,5%	60-30 min	AB(V)	dáv.k.láhev
					0,25%	60 min	A(B)(V)	
					0,75%	15 min	AB(V)	
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
					0,50%	15 min	A(B)(V)	
					1,5%	60 min	A(B)(TM)(V)	
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
					0,25%	30 min	A(B)(V)	
					0,50%	15 min	A(B)(V)	
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	1,50%	60 min	A(B)(V)	
Malé plochy	dezinfekce postřikem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)(T)(V)	TBC 28x/30min. Mělno příst. saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
					neředí se	1 min	ABTM(V)	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol.KAS	neředí se	1 min	A(B)(V)	noro, adeno, SV40
					neředí se	2 min	AB(V)	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	ABTMV	Cl.diff.
						15 min	ABCTMV	
						3 min	A(B)(T)(V)	
						1 min	A(B)(T)(V)	
			DESTIX MED N/Lemon	alkohol.KAS	neředí se	1 min	A(B)(V)	
					neředí se	1 min	A(B)(V)	
Citlivé materiály	inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	3 min	A(B)(T)(V)	
					neředí se	30 sec.	A(B)(V)	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)(TM)(V)	
					1%	60 min	ABTMV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	
					0,5%	60 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory
			TERRALIN PROTECT	alkohol.KAS	neředí se	30 sec.	A(B)(T)(V)	
					neředí se	30 sec.	A(B)(V)	
			INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	6 min	A(B)(TM)(V)	
					neředí se	1 min	ABTM(V)	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	INCIDIN ACTIVE	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTM(V)	
					2%	10 min	A(B)(TMV) + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	A(B)(TMV) + Cl. diff.	
					ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
					pěna	60 min	AB(V) + Cl. diff.	
			INCIDIN RAPID	aldehyd.KAS	2%	60 min	ABTMV	TBC 28x/30min. Mělno příst. saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
					2tbl/10 l	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTM(V) + Cl. diff.	
					2 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTMV + Cl. diff.	
Biologické značení	bič. smetl. v dezinfekčním roztoku, přejít kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik neaplikovat do biologického materiálu)	virové náklady	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec	ABTM(V)	přímé virusicidní
					neředí se	30 sec.	A(B)(T)(V)	
			INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	6 min	A(B)(TM)(V)	
					neředí se	1 min	ABTM(V)	
			DESPREJ	alkohol.KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	
					neředí se	1 min	ABTM(V)	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tbl/10l vody	30 min	ABTMV	
					2tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	15 min	ABTMV + Cl. diff.	
					2tbl / 1,5l vody	15 min	ABCTMV	
Sifony	tbi nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
					1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
					1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
					1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
					1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
					1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	1%	15 min	A(B)(V)	
					1%	15 min	A(B)(TM)(V)	
			DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%	15 min	A(B)(V)	
					1,5%	60 min	A(B)(V)	
			SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	2,5%	30 min	A(B)(T)(V)	
					4%	15 min	A(B)(T)(V)	
			STABIMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%	15 min	A(B)(V)	
					1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.	
			ANIOSEPT AKTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.	
					0,5%	15 min	ABTMV+Cl.diff.	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
					1%	5 min	A(V)	
			INCIDIN ACTIVE	peruhličen disodný	1%	5 min	A(V)	
					0,25%	20 min	A(V)	
			SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(V)	
					0,25%	20 min	A(V)	
			Kyselina amidosulfonová	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(V)	
					0,25%	20 min	A(V)	
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	30 min	A(V)	
					0,25%	30 min	A(V)	
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	A(B)(V)	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC>30 min
					2 tbl/10 l	5 min	A(B)(V)	
			DESAM PRIM	chlór	2%	45 min	ABV	
					5%	30 min	ABTMV + Cl. diff.	
			DESAM EXTRA	KAS, amin	0,5%	15 min	A(B)(T)	
					1%	15 min	A(B)(TV)	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	A(B)(V)	
					1%	5 min	A(V)	
			INCIDIN ACTIVE	peruhličen disodný	1%	5 min	A(V)	
					0,25%	20 min	A(V)	
RUCE A POKOŽKA	mytí rukou	pěnové mýdlo	KIMCARE pěnové mýdlo	alkohol, KAS, kysel.undec	neředěné, 4 ml	30 sec./2x1,5min	A(B)(TM)(V)	
					cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	30 sec	ABTM(V)	
					cca 3ml/2x 5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)	
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec	ABTM(V)	
					cca 3ml/2x 5ml	30 sec	ABTM(V)	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2x1ml	30 sec. /2x1,5min	A(B)(TM)(V)	
					cca 3ml/2x1ml	30 sec. /2x1,5min	A(B)(TM)(V)	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2x1ml	30 sec. /2x1,5min	A(B)(TM)(V)	
					cca 3ml/2x1ml	30 sec. /2x1,5min	A(B)(TM)(V)	
KATÉTRY	katétry, spojovací hadičky	3 x denně celé tělo včetně vlasů	CITROCOREX 2% MD (šedá etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)(TM)(V)	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
					neředí se	1 min	A(B)(TM)(V)	
			SKINSAN SCRUB N / FOAM	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sec	cca 3ml	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty
					dekolonizace MRSA	1 min	A(B)(V)	
			OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)(V)	
					neředí se	60 s	A(B)(V)	
			BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV	
					ředění dle návodu	60 s	ABCTMV	
			INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	vhodné pro diabetiky
					neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	
Sliznice	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	A(B)(TM)(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
					neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	remanentní účinek 6 hodin
			SKINSEPT G	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	remanentní účinek 6 hodin
					neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	
			Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)(TM)(V)	nechat vždy zcela zaschnout
					neředí se	dle návodu výrobce	A(B)(TM)(V)	
			CHLORHEXIDIN 2% alcoholic solution barvený	chlorhexidin, alkohol	neředí se	2 min	A(B)(V)	vhodný i na vstupy centrálních žilních katetrů
					neředí se	2 min	A(B)(V)	
			INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	vhodné pro diabetiky
					neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	A(B)(TM)(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
					neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	remanentní účinek 6 hodin
			SKINSEPT G	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	remanentní účinek 6 hodin
					neředí se	15 s	A(B)(TM)(V)	
			Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)(TM)(V)	

Dezinfekční plán - dodatek Oblastní nemocnice Jičín a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Ruce	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou)	HDR před a po ošetření pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony porušujícími integritu kůže	Sterillium	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	A(B)TM(V)	
			Sterillium classic pure	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	A(B)TM(V)	pro citlivou pokožku
			Sterillium med	alkohol	cca 3 ml/2x5 ml	30 s/ 1,5 min	ABTMV	pro epidemiologicky závažné situace - plně virucidní -pro citlivou pokožku
Citlivé materiály	inkubátory, akryláty, UZ sondy, citlivé plasty	otřít ubrouskem	Meliseptol Wipes Sensitive	KAS, propanol	ubrousek	1 min	A(B)(V)	
Nástroje	dekontaminace nástrojů	zcela ponořit do roztoku, umýt a oplach	Aniosyme XL3	KAS, enzymy	1%	15 min	A(B)TMV + Cl.diff	
Katétry	vstupy infúzních linek	otřít ubrouskem	Puradep	chlorhexidin diglukonát, ethanol	ubrousek	15 s	A(B)(V)	vhodný i na dezinfekci kůže před vpichem
			Soft-Zellin tampóny	Isopropylalkohol	ubrousek	15 s		

Platný od 1.7.2019

Účinnost: A – baktericidní | (B) – omezeně virucidní | B – plně virucidní | T – tuberculocidní | M – mykobaktericidní | (V) – levurocidní – kvasinky | V - fungicidní