

**Dezinfekční plán pro standardní obory
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dávka láhev
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV	
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	Pouze ortopedie NRR
Malé plochy	dezinfekce postříkem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěrem	i UZ sondy, citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol, KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
			INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol, KAS	0,5%	15 min	ABCTMV	
						60 min	A(B)V	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
								plně virucidní
Biologické znečištění	buničinu smočít v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
Sifony	tbi nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje, odsávačky	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávaček		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem, nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	5 min	A(B)V	
		potrubí RHB van	SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(B)V	
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	20 min	—	teplota vody 40-60°C
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla. TBC=30 min
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol		2 min	ABTMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT					
			SILONDA	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	punkce 1 min	A(B)TMV
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se			pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			Braunoderm	alkohol, PVP-jod				nechat vždy zcela zaschnout
	Prevence plisni nohou	postřík	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	vhodné pro diabetiky
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRS A	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)V	
Sliznice	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V	

Dezinfekční plán intenzivních oborů Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dávč. láhev
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV	
Malé plochy	dezinfekce postříkem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěrem	I UZ sondy, citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
					2%	15 min	ABCTMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)V	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně virucidní
	Biologické znečištění	buničinu smíchat v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postříky neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje, odsávací	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávacích		SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
			SEKUZYME	enzym	0,5%	15 min	-----	
	druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	4%	15 min	ABTMV	
	SEKUSEPT AKTIV		peruhličen disodný	2%	10 min	ABTMV		
	SEKUSEPT AKTIV		peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV		
vyšší stupeň dezinfekce (VSD)	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	5%	60 min	ABCTMV			
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min
Ruky	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol		2 min	ABTMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
		SILONDA						
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se		A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
		Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se		A(B)TMV		
	Prevence plisní nohou	postřík	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	vhodné pro diabetiky
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)V	
Sliznic e	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENISEPT	octenidinhydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V	



**Dezinfekční plán pro laboratorní obory
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní misky, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv. láhev
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	Pouze pro PKBD NBR
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1,5%	60 min	A(B)TMV	
Malé plochy	dezinfekce postříkáním		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	30 min	A(B)TMV	
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
Citlivé materiály	dezinfekce otěrem	citlivé materiály	INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
Epidemiologicky závazné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
Biologické znečištění	ruce	omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možné přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
			SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně vinutí
Sifony	těl nebo roztok	virové náklady	DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
			SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	2 min	ABTMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	pro alergiky
RUCE A POKOŽKA	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
			BALMEA/BAL MEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
dezinfectce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat		SILONDA	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	

Poznámka: dezinfekční přípravky , které nejsou obsaženy v dezinfekčním plánu lze použít pouze v souladu se schváleným Provozním řádem nebo tam, kde je stanoveno v návodu výrobce

Dezinfekční plán Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.



Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podlahní mísy, umyvadla	INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	0,25-0,5%	60-30 min	ABTMV	TBC 30 min, dávka láhev
		INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dávka láhev
		INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	dávkováci láhev
		INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1,5%	60 min	A(B)TMV	
		INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%-0,5%	30 min	A(B)TMV	
		MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	60-15 min	A(B)TMV	dávkováci láhev
Malé plochy	dezinfekce postřikem	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	pro lehké povrchy a nerez
		DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
	dezinfekce otěrem	DESTIX MED N Lemon	alkohol, KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
		INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
		DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
		SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	inkubátory, akrylát, citlivé plasty	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
		TERRALIN PROTECT	alkohol, KAS	0,5%	15 min	ABCTMV	
		DESAM SOLID	chlórhexid	0,15%	15 min	ABCTMV	JEN pro inkubátory
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	1 sáček/SI
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
		INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
		MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
	ruce	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	přímé vyručení
	biologické znečištění	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min	A(B)TMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
		DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se	max 15 min	ABTMV	
Sifony	tbl nebo roztok	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2tbl/10l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	Roztok pro dezinfekci a čištění dle vyhl. 306/2012 Sb. každý den čerstvý!
		ESO DETERFERRI	KAS	1%	30 min	A(B)V	
		DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
	mytí přístrojů	SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	3-1%	15-60 min	A(B)TMV	
		SEKUZIME	enzym	0,5%	15 min		
	druhý stupeň dezinfekce	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	4%	15 min	ABTMV	
Vany	rehabilitační vany	SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	10 min	ABTMV	denně čerstvý
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý
		SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	5%	60 min	ABCTMV	použití až 14 dní
		INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	
		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
		MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
Nádoby	nádoby	SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(B)V	
		SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	20 min		teplota vody 40-60°C
		MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla TBC=30 min
		SAVO PRIM	chlór	3%	15 min	ABTMV	
	mytí rukou	KIMCARE pěnové mýdlo		neředěné, 4 ml			
		SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel. undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	pro alergiky
		SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x5ml	2 min	ABTMV	
		SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
		SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	2 min	ABTMV	
		SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
		SEPTODERM SOFT (BAG)	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
		SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
		SILONDA					
		SILONDA LIPID, SENSITIVE	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
		BALMEA/BALMEA PROTECT					
		SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
Kožní	dezinfekce kůže před vpichem	CITROCLOREX 2% CLEAR (žlutá etiketa)	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)TMV	remanentní účinek 6 hodin
	dezinfekce operačního pole	SKINSEPT G	alkohol	neředí se		A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
		Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se		A(B)TMV	
	Prevenice plísni nohou	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	vhodné pro diabetiky
	katétry	CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
		SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se		A(B)V	
MRSA	dekolonizace MRSA	PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze
		SKINMAN SCRUB FOAM	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	pěnová forma pro mobilní pacienty
		SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nespoužívat do 6ti dekolonizace MRSA
Sliznice	dezinfekce sliznic	OCTENISEPT	octenidinhydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V	
	rány	BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV	