

**Dezinfekční plán pro standardní obory
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

| | Použití | Způsob | Přípravek | Účinná látka | Koncentrace | Expozice | Účinnost | Poznámka |
|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---|
| Plochy, povrchy, předměty | podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla | odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku | INCIDIN EXTRA N | KAS, glukoprotamin | 0,25%-0,5% | 60-15 min | A(B)TMV | TBC 60-30 min, dávka láhev |
| | | | INCIDIN OXYDES | peroxid vodíku, KAS | 1% | 30 min | A(B)TMV | |
| | | | INCIDIN PLUS | glukoprotamin | 0,25%-0,5% | 60-15 min | A(B)TMV | Pouze ortopedie NRK |
| Malé plochy | dezinfekce postříkem | | INCIDIN LIQUID | alkohol | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | i pro leské povrchy a nerez |
| | | | DESPREJ | alkohol,KAS | neředí se | | ABTMV | |
| | dezinfekce otěrem | i UZ sondy,citlivé materiály | DESTIX MED N/Lemon | alkohol,KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | |
| | | | INCIDES N (bal 90 ks) | alkohol | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | |
| | | | DESTIX MK 75 | KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)V | |
| | | | SANICLOTH ACTIVE | KAS | neředí se | do zaschnutí | ABTMV | |
| Citlivé materiály | Inkubátory, akryláty, citlivé plasty | nastříkat, rozetřít | INCIDIN FOAM | glukoprotamin | neředí se | 5 min | A(B)TMV | |
| | | | DESPREJ SENSITIVE | KAS | neředí se | 5 min | A(B)TMV | |
| | | omýt roztokem | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 15 min | A(B)TMV | |
| | | | TERRALIN PROTECT | alkohol,KAS | 0,5% | 60 min | A(B)V | |
| Epidemiologicky závažné situace | plochy, předměty | omýt roztokem | DESAM SOLID | chlordioxid | 0,15% | 15 min | ABCTMV | 1 sáček/5l |
| | | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 5 min | ABTMV + Cl. diff. | |
| | | | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 5 min | A(B)TMV + Cl. diff. | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 2% | 15 min | ABCTMV | |
| | | | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 2tbl/10 l | 30 min | ABTMV | |
| | ruce | virové nákazy | SKINMAN SOFT PROTECT / FF | alkohol | neředí se | 2 min | ABTMV | plně virucidní |
| Biologické znečištění | buničinu smočít v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postříky neaplikovat do biologického materiálu) | | DESPREJ | alkohol,KAS | neředí se | 1 min | ABTMV | buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu |
| Sifony | tbl nebo roztok | denně | MEDICARINE | dichlorizokyan.sodný | 1tbl/1,5 l vody | 30 min | ABTMV | nechat nejlépe přes noc |
| Nástroje a přístroje, odsávačky | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávaček | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 15 min | A(B)TMV | |
| | | | DISCLEEN EXTRA | amin, KAS | 1% | 15 min | A(B)TMV | |
| Vany | rehabilitační vany | omýt roztokem,nechat působit, oplach | MEDICARINE | dichlorizokyan. sodný | 2 tbl/10 l | 5 min | ABV | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 5 min | A(B)V | |
| | | potrubí RHB van | SAVAGRO A+ | chlornan sodný | 0,25% | 20 min | A(B)V | |
| | | | SAVAGRO K | kys. fosforečná | 0,25% | 20 min | — | teplota vody 40-60°C |
| Nádoby | nádoby | očistit, ponořit do roztoku, oplach | MEDICARINE | dichlorizokyan.sodný | 2 tbl/10 l | 5 min | ABV | Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min |
| RUCE A POKOŽKA | hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou | HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže. | SKINMAN SOFT N | alkohol, KAS, kysel.undec | cca 3ml/2x5ml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | |
| | | | SKINMAN SOFT PROTECT | alkohol | cca 3ml/2x5ml | 20 sec./1,5min | A(B)TMV | |
| | | | SEPTODERM BAG | alkohol | | 2 min | ABTMV | |
| | | | SEPTODERM GEL BAG | alkohol | cca 3ml/2xml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | |
| | | | SPIRIGEL COMPLETE | alkohol | cca 3ml/2x 5ml | 0,5/2x1,5min | ABTMV | |
| | | | SOFTA MAN VISCORUB | alkohol | cca 3ml/2x 5 ml | 0,5/2x 1,5 min | A(B)TMV | |
| | regenerace rukou | po mytí a dezinfekci | BALMEA/BALMEA PROTECT | | | | | |
| | | | SILONDA | regenerační krém | | | | nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky |
| | dezinfekce kůže před vpichem | otřít tamponem nebo postříkat | SKINSEPT F | alkohol, peroxid vod. | neředí se | min. 15 s punkce 1 min | A(B)TMV | pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min |
| | dezinfekce operačního pole | nanést sterilním tamponem | SKINSEPT G | alkohol | neředí se | | A(B)TMV | nechat vždy zcela zaschnout |
| | | Braunoderm | alkohol, PVP-jod | neředí se | | A(B)TMV | | |
| Prevence plísni nohou | postřík | INCIDIN M SPRAY EXTRA | alkohol, chlorhex., perox. | neředí se | do zaschnutí | A(B)V | vhodné pro diabetiky | |
| Katétrý | katétrý, spojovací hadičky | | CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa) | isopropanol, chlorhexidin digluconát | neředí se | 1 min | A(B)TMV | remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci |
| MRSA | dekolonizace MRSA | 3 x denně celé tělo včetně vlasů | SKINMAN SCRUB | triclosan | neředí se | 30 s | A(B)V | mycí emulze |
| | | PROSAVON SCRUB | chlorhexidin, KAS | neředí se | A(B)V | | | |
| Sliznic | dezinfekce sliznic | před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny | SKINSEPT MUCOSA | alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku | neředí se | 60 s | A(B)V | nepoužívat do očí dekolonizace MRSA |
| | | | OCTENISEPT | octenidínhydrochlorid | neředí se | 60 s | A(B)V | |

Dezinfekční plán intenzivních oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.

| | Použití | Způsob | Přípravek | Účinná látka | Koncentrace | Expozice | Účinnost | Poznámka | |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--|
| Plochy, povrchy, předměty | podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla | odstranit nečistoty z podložní mísy, ponořit do roztoku | INCIDIN EXTRA N | KAS, glukoprotamin | 0,25%-0,5% | 60-15 min | A(B)TMV | TBC 60-30 min. dávka láhev | |
| | | | INCIDIN OXYDES | peroxid vodíku, KAS | 1% | 30 min | A(B)TMV | | |
| Malé plochy | dezinfekce postříkem | | INCIDIN LIQUID | alkohol | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | i pro lesklé povrchy a nerez | |
| | | | DESPREJ | alkohol, KAS | neředí se | | ABTMV | | |
| | dezinfekce otěrem | i UZ sondy, citlivé materiály | DESTIX MED N/Lemon | alkohol, KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | | |
| | | | INCIDES N (bal 90 ks) | alkohol | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | | |
| | | | DESTIX MK 75 | KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)TV | | |
| | | | SANICLOTH ACTIVE | KAS | neředí se | do zaschnutí | ABTMV | | |
| Citlivé materiály | Inkubátory, akryláty, citlivé plasty | nastříkat, rozetřít | INCIDIN FOAM | glukoprotamin | neředí se | 5 min | A(B)TMV | | |
| | | | DESPREJ SENSITIVE | KAS | neředí se | 5 min | A(B)TMV | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 15 min | A(B)TMV | | |
| | | omýt roztokem | | | 2% | 15 min | ABCTMV | | |
| | | | TERRALIN PROTECT | alkohol, KAS | 0,5% | 60 min | A(B)TV | | |
| | | | | | | | | | |
| Epidemiologicky závažné situace | plochy, předměty | omýt roztokem | DESAM SOLID | chlordioxid | 0,15% | 15 min | ABCTMV | 1 sáček/5l | |
| | | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 5 min | ABTMV + Cl. diff. | TBC 2tbl/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH | |
| | | | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 5 min | A(B)TMV + Cl. diff. | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 2% | 15 min | ABCTMV | | |
| | | | | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 2tbl/10 l | 30 min | ABTMV | |
| | ruce | virové nákazy | SKINMAN SOFT PROTECT / FF | alkohol | neředí se | 2 min | ABTMV | piné virucidní | |
| Biologické znečištění | buničinu smočít v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu) | | DESPREJ | alkohol, KAS | neředí se | 1 min | ABTMV | buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu | |
| Sifony | tbl nebo roztok | denně | MEDICARINE | dichlorizokyan.sodný | 1tbl/1,5 l vody | 30 min | ABTMV | nechat nejlépe přes noc | |
| Nástroje a přístroje, odsávačky | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávaček | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 15 min | A(B)TMV | | |
| | | | DISCLEEN EXTRA | amin, KAS | 1% | 15 min | A(B)TMV | | |
| | | | SEKUZYME | enzym | 0,5% | 15 min | ---- | | |
| | druhý stupeň dezinfekce | ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou | SEKUSEPT FORTE | aldehydy, KAS, glyoxal | 4% | 15 min | ABTMV | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 2% | 10 min | ABTMV | | |
| | | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 2% | 15 min | ABCTMV | | |
| vyšší stupeň dezinfekce (VSD) | SEKUSEPT FORTE | aldehydy, KAS, glyoxal | 5% | 60 min | ABCTMV | | | | |
| Nádoby | nádoby | očistit, ponořit do roztoku, oplach | MEDICARINE | dichlorizokyan.sodný | 2 tbl/10 l | 5 min | ABV | Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min | |
| Hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou | regenerace rukou | po mytí a dezinfekci | SKINMAN SOFT N | alkohol, KAS, kysel.undec | cca 3ml/2x5ml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | | |
| | | | SKINMAN SOFT PROTECT | alkohol | cca 3ml/2x5ml | 20 sec./1,5min | A(B)TMV | | |
| | | | SEPTODERM BAG | alkohol | | 2 min | ABTMV | | |
| | | | SEPTODERM GEL BAG | alkohol | cca 3ml/2xml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | | |
| | | | SPIRIGEL COMPLETE | alkohol | cca 3ml/2x 5ml | 0,5/2x1,5min | ABTMV | | |
| | | | SOFTA MAN VISCORUB | alkohol | cca 3ml/2x 5 ml | 0,5/2x 1,5 min | A(B)TMV | | |
| | dezinfekce kůže před vpichem | otřít tamponem nebo postříkat | BALMEA/BALMEA PROTECT | regenerační krém | nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky | | | | |
| | | | SILONDA | | | | | | |
| | | | SKINSEPT F | alkohol, peroxid vod. | neředí se | min. 15 s | punkce 1 min | A(B)TMV | pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min |
| | | | SKINSEPT G | alkohol | neředí se | | | A(B)TMV | nechat vždy zcela zaschnout |
| dezinfekce operačního pole | nanést sterilním tamponem | Braunoderm | alkohol, PVP-jod | neředí se | | | A(B)TMV | | |
| Prevence plisní nohou | postřík | INCIDIN M SPRAY EXTRA | alkohol, chlorhex., perox. | neředí se | | do zaschnutí | A(B)TV | vhodné pro diabetiky | |
| Katétry | katétry, spojovací hadičky | | CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa) | isopropanol, chlorhexidin diglukonát | neředí se | 1 min | A(B)TMV | remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci | |
| MRS A | dekolonizace MRSA | 3 x denně celé tělo včetně vlasů | SKINMAN SCRUB | triclosan | neředí se | 30 s | A(B)TV | mycí emulze | |
| | | PROSAVON SCRUB | chlorhexidin, KAS | neředí se | A(B)TV | | | | |
| Sliznice | dezinfekce sliznic | před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny | SKINSEPT MUCOSA | alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku | neředí se | 60 s | A(B)TV | nepoužívat do očí dekolonizace MRSA | |
| | | | OCTENISEPT | octenidinhydrochlorid | neředí se | 60 s | A(B)TV | | |



Dezinfekční plán pro laboratorní obory Oblastní nemocnice Náchod a.s.

| Použití | Způsob | Přípravek | Účinná látka | Koncentrace | Expozice | Účinnost | Poznámka |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------|---|
| Plochy, povrchy, předměty | odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku | INCIDIN EXTRA N | KAS, glukoprotamin | 0,25%-0,5% | 60-15 min | A(B)TMV | TBC 60-30 min, dávka. láhev |
| | | INCIDIN PRO | amin, KAS | 0,25% | 30 min | A(B)V | Pouze pro PKBD NBR |
| Malé plochy | dezinfekce postříkem | INCIDIN OXYDES | peroxid vodíku, KAS | 1% | 60 min | A(B)TMV | |
| | | INCIDIN LIQUID | alkohol | neředí se | 30 min | A(B)TMV | i pro lesklé povrchy a nerez |
| Citlivé materiály | nastříkat, rozeřít | DESPREJ | alkohol, KAS | neředí se | do zaschnutí | ABTMV | |
| | | DESTIX MED N/Lemon | alkohol, KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | |
| akrylát, citlivé plasty | omýt roztokem | INCIDES N (bal 90 ks) | alkohol | neředí se | do zaschnutí | A(B)TMV | |
| | | DESTIX MK 75 | KAS | neředí se | do zaschnutí | A(B)V | |
| Epideimologický závažné situace | omýt roztokem | SANICLOTH ACTIVE | KAS | neředí se | do zaschnutí | ABTMV | |
| | | INCIDIN FOAM | glukoprotamin | neředí se | 5 min | A(B)TMV | |
| Biologické znečištění | vřové náklady | DESPREJ SENSITIVE | KAS | neředí se | 5 min | A(B)TMV | |
| | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 1% | 15 min | A(B)TMV | |
| Sifony | denně | DESAM SOLID | chlordioxid | 0,15% | 15 min | ABCTMV | 1 sáček/5l |
| | | INCIDIN OXYWIPE S | peroxid vodíku | ubrousek | 5 min | ABTMV + Cl. diff. | |
| RUCE A POKOŽKA | HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před dezinfekce rukou | INCIDIN OXYFOAM S | peroxid vodíku | pěna | 5 min | A(B)TMV + Cl. diff. | |
| | | SEKUSEPT AKTIV | peruhličitán disodný | 2% | 15 min | ABCTMV | |
| RUCE A POKOŽKA | regenerace rukou | MEDICARINE | dichlorizokyanurát sodný | 2tbl/10 l | 30 min | ABTMV | TBC 2tbl/30min. Možná přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH |
| | | SKINMAN SOFT PROTECT / FF | alkohol | neředí se | 2 min | ABTMV | plně vinucidní |
| RUCE A POKOŽKA | otřít tamponem nebo postříkat | DESPREJ | alkohol, KAS | neředí se | 1 min | ABTMV | buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu |
| | | MEDICARINE | dichlorizokyan, sodný | 1tbl/1,5 l vody | 30 min | ABTMV | nechat nejlépe přes noc |
| RUCE A POKOŽKA | po mytí a dezinfekci | SKINMAN SOFT N | alkohol, KAS, kysel.undec | cca 3ml/2x5ml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | |
| | | SKINMAN SOFT PROTECT | alkohol | cca 3ml/2x5ml | 20 sec./1,5min | A(B)TMV | |
| RUCE A POKOŽKA | dezinfekce kůže před vpichem | SEPTODERM BAG | alkohol | cca 3ml/2xml | 2 min | ABTMV | |
| | | SEPTODERM GEL BAG | alkohol | cca 3ml/2xml | 0,5/2x1,5min | A(B)TMV | pro alergie |
| RUCE A POKOŽKA | otřít tamponem nebo postříkat | SPIRIGEL COMPLETE | alkohol | cca 3ml/2x 5ml | 0,5/2x1,5min | ABTMV | |
| | | SOFTA MAN VISCORUB | alkohol | cca 3ml/2x 5 ml | 0,5/2x 1,5 min | A(B)TMV | |
| RUCE A POKOŽKA | otřít tamponem nebo postříkat | BALMEA/BALMEA PROTECT | regenerační krém | nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky | | | |
| | | SILONDA | alkohol, peroxid vod. | neředí se | min. 15 s punkce 1 min | A(B)TMV | pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min |
| RUCE A POKOŽKA | otřít tamponem nebo postříkat | SKINSEPT F | alkohol, peroxid vod. | neředí se | min. 15 s punkce 1 min | A(B)TMV | |

Poznámka: dezinfekční přípravky , které nejsou obsaženy v dezinfekčním plánu lze použít pouze v souladu se schváleným Provozním řádem nebo tam, kde je stanoveno v návodu výrobce

| Kategorie | Plochy, povrchy, předměty | Použití | Způsob | Přípravek | Účinná látka | Koncentrace | Expozice | Účinnost | Poznámka | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | ruce | malé plochy | citlivé materiály | epidemiologicky závažné situace | biologické znečištění | silfony | nástroje a přístroje |
| Kategorie | dezinfectace postřikem | podlahy, plochy, nástroje, stoly, vozíky, podlahová úpryska | odstranit nečistoty z podlahy, mra, ponořit do roztoku | INCIDIN PLUS | glukoprolamin | 0,25% | 30 min | AB(V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | 0,50% | 60 min | AB(TM/V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | 1,5% | 30 min | AB(V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | 0,25% | 15 min | AB(V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | 1,50% | 60 min | AB(V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00% | 30 min | AB(TM/V) | dávkovací láhev | | | | | | | |
| | | | | | | Malé plochy | dezinfectace otěsem | 1. UZ sondy, citlivé materiály | načistit, přečistit | INCIDIN FOAM | alkohol, KAS | neředí se | 1 min | AB(TM/V) | TBC znečištění: láhev, podlahy, nástroje a materiály nebo znečištěným pH 1 pro velké povrchy a malé non-alkoh. SVA0 | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(T/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(V) | | |
| Citlivé materiály | Inkubatory, akryly, citlivé plasty | omýt roztokem | načistit, přečistit | INCIDIN ACTIVE | alkohol, KAS | neředí se | 30 min | AB(T/V) | JEN pro inkubatory | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 30 sec. | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 5 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 60 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| Epidemiologicky závažné situace | ruce | plochy, předměty | virové infekce | SKINMAN SOFT PROTECT / FF | alkohol | neředí se | 5 min | AB(TM/V) | přít. virucidní | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 1 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | | | | | | | |
| | | | | | | Biologické znečištění | bandáže, obvazy, dezinfekční roztoky, přehyby, kontaminovaná plocha, exponovaná, po te aplikoval předmět dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu) | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek | | zcela ponořit do roztoku, omýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou | MEDICARINE | dichloroxyanurát sodný | neředí se | 30 min | AB(TM/V) + Cl, diff. | funkce po uplynutí exp. doby do ml. (období) |
| | | | | | | | | | | | | | neředí se | 1 min | AB(TM/V) | |
| | | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | |
| | | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | |
| | | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | |
| | | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | |
| Silfony | tbl nebo roztok | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek | zcela ponořit do roztoku, mračit přístroj, opláchnout pitnou vodou | MEDICARINE | dichloroxyanurát sodný | | | | neředí se | | | | 30 min | AB(TM/V) | nečist. nejlépe přes noc | |
| | | | | | | | | | neředí se | | | | 1 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | neředí se | | | | 30 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | neředí se | | | | 30 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | neředí se | | | | 30 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | neředí se | | | | 30 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | Nástroje a přístroje | mýti přístroje | dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek | zcela ponořit do roztoku, mračit přístroj, opláchnout pitnou vodou | MEDICARINE | dichloroxyanurát sodný | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | doplně dezinf. |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| Vany | rehabilitační vany | omýt roztokem, nečist. působit, opláchnout | potrubí RHB van | MEDICARINE | dichloroxyanurát sodný | | | | | | | neředí se | 5 min | AB(V) | teplota vody 40-60°C | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 20 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(V) | | |
| | | | | | | Nádoby | nádoby | odstát, ponořit do roztoku, opláchnout | DESAM EXTRA | KAS, amin | chlor | neředí se | 15 min | AB(TM/V) + Cl, diff. | | Před dezinfekcí odstranit zbytky jódu TBC-30 min |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(TM/V) + Cl, diff. | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 15 min | AB(TM/V) | | |
| RUCE A POKOŽKA | regenerace rukou | po mýti a dezinfekci | pěnové mýdlo | KIMCARE | KAS, kyselá undec | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | teplota vody 40-60°C | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 30 min | AB(V) | | |
| | | | | | | MRSA | dekolonizace MRSA | 3 x denně celé tělo včetně vlasů | před mýtím a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny | SKINSAN SCRUB N / FOAM | chlorhexidin, KAS | neředí se | 1 min | AB(V) | | mýti emulze, rozčistit ústředí až 24 hodin, přirová forma pro močovníkaderby |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| Sliznice | rány | vypíchnout a opláchnout ran | vypíchnout a opláchnout ran | BRAUNOL | PVP-jod | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(TM/V) | neaplikovat do očí, dekolonizace MRSA | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |
| | | | | | | | | | | | | neředí se | 60 s | AB(V) | | |