

Dezinfekční plán pro standardní obory Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka	
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dávka láhev	
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV		
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	Pouze ortopedie NRK	
Malé plochy	dezinfekce postřikem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez	
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se		ABTMV		
			DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se		A(B)TMV		
	dezinfekce otěrem	I UZ sondy,citlivé materiály	INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV		
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V		
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV		
			INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV		
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV		
		omýt roztokem	TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	15 min	ABCTMV		
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.		
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV		
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV		TBC 2tbl/30min Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně virucidní	
	Biologické znečištění	buničinu smočit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik) neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc	
Nástroje a přístroje, odsávačky	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávaček		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV		
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV		
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	5 min	A(B)V		
		potrubí RHB van	SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(B)V		
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	20 min	—		teplota vody 40-60°C
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min	
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV		
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV		
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	2 min	ABTMV		
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol		0,5/2x1,5min	A(B)TMV		
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol		0,5/2x1,5min	ABTMV		
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV		
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky				
		SILONDA							
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se			A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
Braunoderm			alkohol, PVP-jod	A(B)TMV					
Prevence plísni nohou	postřik	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí		A(B)V	vhodné pro diabetiky	
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min		A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRS A	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze	
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)V		
Sliznice	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA	
			OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V		

Dezinfekční plán intenzivních oborů Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dávka láhev
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV	
Malé plochy	dezinfekce postříkem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěrem	I UZ sondy,citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
		omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
					2%	15 min	ABCTMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)V	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně virucidní
	Biologické znečištění	buničinu smíchat v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postříky neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje, odsávací	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávacích		SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
			SEKUZYME	enzym	0,5%	15 min	-----	
	druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	4%	15 min	ABTMV	
	SEKUSEPT AKTIV		peruhličen disodný	2%	10 min	ABTMV		
	SEKUSEPT AKTIV		peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV		
vyšší stupeň dezinfekce (VSD)	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	5%	60 min	ABCTMV			
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min
	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
						2 min	ABTMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol				
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
	SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV			
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
		SILONDA						
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se		A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
		Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se		A(B)TMV		
Prevence plisní nohou	postřík	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	vhodné pro diabetiky	
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRS A	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)V	mycí emulze
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)V	
Sliznic e	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)V	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENISEPT	octenidinhydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)V	



**Dezinfekční plán pro laboratorní obory
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní misky, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv. láhev
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)V	Pouze pro PKBD NBR
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1,5%	60 min	A(B)TMV	
Malé plochy	dezinfekce postříkáním	citlivé materiály	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	30 min	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
			DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
Citlivé materiály	dezinfekce ořtrem	citlivé materiály	INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)V	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
Biologické znečištění	ruce	omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možné přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
			SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně vinucídi
Sifony	těl nebo roztok	virové náklady	DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
			SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	2 min	ABTMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	pro alergiky
RUCE A POKOŽKA	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
			BALMEA/BAL MEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
dezinfece kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	otřít tamponem nebo postříkat	SILONDA	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	

Poznámka: dezinfekční přípravky , které nejsou obsaženy v dezinfekčním plánu lze použít pouze v souladu se schváleným Provozním řádem nebo tam, kde je stanoveno v návodu výrobce

[illegible]