

CO	KDY	JAK	ČÍM	KONCENTRACE - EXPOZICE	ÚČINNOST
	kontaktní plochy (kliky, madla apod.)	1x denně nebo dle potřeby	dez. roztokem vytřít namokro a nechat zaschnout	INCIDIN RAPID	0,25% - 60 minut A(B)(V)
				INCIDIN PRO	0,5% - 30 minut AB(V)
	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky	1 x denně exponované prostory		INCIDIN LIQUID	0,25% - 30 minut A(B)(V)
				INCIDIN OXYFOAM S	0,5% - 15 minut A(B)(V)
		3 x týdně společné prostory		MEDICARINE	2 tablety na 10 l vody - 30 minut AB(V)*
					3 tablety na 10 l vody - 30 minut ABTMV*
	malé plochy, vozíky, lehátka, přístroje	dle potřeby	postříkat a nechat zaschnout nebo dle postupu	INCIDIN LIQUID	neředí se - do zaschnutí A(B)TM(V)*
				INCIDIN FOAM	neředí se - do zaschnutí A(B)TM(V)*
	shoz prádla	dle stanoveného postupu		INCIDIN OXYFOAM S	neředí se - do zaschnutí ABCTMV*
	malé plochy, vyšetřovací a základové stoly, vozíky, instrumentální stoly, lehátka, přístroje	dle potřeby	utřít ubrouskem	SANICLOTH AKTIV	neředí se - do zaschnutí ABTMV*
				INCIDIN OXYWIPES S	neředí se - do zaschnutí A(B)TM(V)*
		dle potřeby	utřít ubrouskem	INCIDIN WIPES	aktuálně používaný dezinfekční produkt naředěný do uzavřených nádob ABCTMV*
	nádobu toaletní křesla, nádoby na moč, emitní misky, podložní misky, umyvadlo z umělé hmoty	v případě potřeby	manuální	MEDICARINE	3 tablety na 10 l vody - 30 minut ABTMV*
			automatické		dle mycího automatu -
	odpady, kanálky, sifony	1 x 14 dní	prolít připraveným roztokem	MEDICARINE	1 tableta do 1,5 l vody 30 minut a déle ABTMV
	wc štětky	1 x týdně	naplnit nádobku na WC štětku	MEDICARINE	2 tablety na 10 l - 30 minut
	kontaminace biologickým materiálem	ihned po znečištění předměty ponořit do dezinfekčního roztoku, plochy překrýt buničitou vatou namočenou do dezinfekčního roztoku, po expoziční době následuje mechanická očista		MEDICARINE	3 tbl. / 10 l vody - 30 minut ABTMV*
	epidemiologicky závažné situace	plochy a předměty		INCIDIN ACTIVE	1 % - 60 minut ABCTMV*
		dezinfekce malých povrchů		INCIDIN OXYFOAM S INCIDIN OXYWIPES S	neředí se - 3 až 30 minut ABCTMV
		dezinfekce rukou		SKINMAN SOFT PROTECT	HDR neředí se - 2 minuty ABTMV
	vany, vířivky, koupací lůžko	po použití nebo dle potřeby	dokonale smočít roztokem, nechat působit, opláchnout	INCIDIN ACTIVE	1% - 5 minut A(V)
				INCIDIN OXYDES	1% - 5 minut
	dekontaminace a dezinfekce nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku, mýt pod hladinou roztoku, nechat působit předepsanou dobu, oplach pitnou vodou	SEKUSEPT AKTIV		1% - 60 minut A(B)TMV*
					2% - 10 minut ABTM(V)
			SEKUSEPT PLUS		1% - 15 minut A(B)V
	dezinfekce a ošetřování katétrů a spojek reziiduální účinek 24 hodin	postříkat nebo otřít		CITROCLOREX 2% MD	neředí se - 60 vteřin A(B)V
	mytí rukou	několikrát denně	vodou a mycí emulzí	TEKUTÁ MÝDLA MANISOFT FOAM	neředí se bez dezinfekčního účinku
	mytí rukou s dezinfekčním účinkem	několikrát denně	vodou a mycí emulzí	SKINMAN SCRUB N	neředí se 30 vteřin 60 vteřin A(B) A(B)(V)
	hygienická dezinfekce rukou	před a po ošetření každého pacienta a při jakékoliv kontaminaci	vetřít do suchých rukou	SKINMAN SOFT N	neředí se 30 vteřin A(B)T(V)
				SPIRIGEL COMPLETE	neředí se 30 vteřin ABT(V)
				SKINMAN SOFT PROTECT (FF)	neředí se 30 vteřin 120 vteřin ABTMV*
	dezinfekce kůže	před vpichy nebo jinými zákroky	postříkat nebo otřít tamponem	SKINSEPT F	neředí se 15 vteřin A(B)(V)
		před vpichem především zavádění katétrů		CITRO CLOREX 2% (reziiduální 6 hodin)	neředí se 30 vteřin A(B)(V)
	sliznice	k dezinf. sliznic dutiny ústní, cévkování, urologie, hygiena dutiny ústní		SKINSEPT MUCOSA	neředí se 1 min. do zaschnutí A(B)(V)
	ruce a pokožka, regenerace	dle potřeby	vetřít do rukou	SILONDA, SILONDA LIPID, SILONDA SENSITIVE	
	prevence plísni	denně	vystříkat obuv	INCIDIN MSE	neředí se 1 min., zaschnutí A(B)(V)
	Návod k použití: odšroubujte bílý uzávěr. V případě otočení láhve dnem vzhůru (o 180°) vyteče z dávkovače 20 ml koncentrátu, pro dávku dalších 20 ml je třeba znovu otočit láhev do polohy dnem dolů a v případě vyšší dávky postup opakovat – otočit opět láhev dnem vzhůru. Pozor - pokud otočíte láhev pouze o 90°, vytéká z ní koncentrát kontinuálně bez přerušení. Tento způsob aplikace poslouží v případě, kdy se provádí ředění pomocí odměrky. 1 dávka do 8 litrů studené vody 0,25 % roztok 2 dávky do 8 litrů studené vody 0,50 % roztok 3 dávky do 8 litrů studené vody 0,75 % roztok Láhev je vybavena dvěma uzávěry – hrdlo se zeleným uzávěrem slouží k doplňování koncentrátu z větších balení (6 l kanystr), hrdlo s bílým uzávěrem obsahuje integrovaný dávkovač a slouží k dávkování koncentrátu do předem definovaného množství vody.				
A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub B virucidní účinek proti norovirům (polio, adeno a norovirus (MNV)) (B) virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně rotavirů u dezinfekce rukou) C inaktivace bakteriálních spór T usmrcení mykobakterií kompl. M. Tuberculosis (testováno v SÚZ Praha) M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií (v případě masivní kontaminace aviárními mykobakteriemi je nutno expozici zdvojnásobit) V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby * včetně MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)			Komplexní program dezinfekčních prostředků Ecolab je z hlediska rezistence mikroorganismů řešen užitím různých účinných látek tak, že je možno střídání v rámci tohoto dezinfekčního plánu. Přípravky ředit studenou vodou ! Při střídání produktů s jinou účinnou látkou dle rozpisu omýt povrchy běžným saponátem. Leden, Březen, Květen, Červenec, Září, Listopad Speciální produkty na určené aplikace Únor, Duben, Červen, Srpen, Říjen, Prosinec		