Dezinfekční plán
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolky, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	0,25-0,5%	60-30 min	AB(V)	dávk láhev
					0,25%	60 min	A(B)(V)	
					0,75%	15 min	AB(V)	
			INCIDIN PRO	5min. KAS	0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
					0,50%	15 min		
					1,5%	60 min	A(B)TM(V)	
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)(V)	
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
					0,50%	15 min	A(B)(V)	
					1,50%	60 min	A(B)TM(V)	
					3,00%	30 min		
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	5 min	A(B)V	TBC 2tbl/30min Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
Malé plochy	dezinfekce postřikem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	1 min	A(B)(V)	noro, adeno, SV40
						2 min	AB(V)	
						5 min	ABTMV	Cl.diff.
						15 min	ABCTMV	
	dezinfekce otěrem		DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	1 min	A(B)TM(V)	
			INCIDES N (baf 50 ks)	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	
		i UZ sondy,citlivé materiály	DESTIX MK 75	KAS	neředí se	1 min	A(B)(V)	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	30 min	ABTV	
						15 min	A(B)TV	
						1 min	A(B)(V)	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	1 min	A(B)(V)	adeno, SV40
						5 min	A(B)TMV	Cl.diff.
						15 min	A(B)TMV	Cl.diff. + MNV
						30 min	ABCTMV	
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, otetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	3 min	A(B)T(V)	
						30 sec.	A(B)(V)	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TM(V)	
		omýt roztokem	SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	60 min	ABTM(V)	
					2%	15 min	ABCTMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	INCIDIN ACTIVE	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTM(V)	
						10 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	2%	60 min	AB(V) + Cl.diff.	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
					1 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.	
					2 tbl / 1,5l vody	15 min	ABTMV + Cl.diff.	
					5tbl / 1,5l vody	15 min	ABCTMV	
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec	ABTM(V)	plně virucidní
Biologické znečištění	buničinu smočit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu)		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min	A(B)TM(V)	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tbl/10l vody	30 min	ABTMV	
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	1%	15 min	A(B)(V)	
			DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%	15 min	A(B)TM(V)	
			SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	1%	15 min	A(B)(V)	
					1,5%	60 min	A(B)T(V)	
					2,5%	30 min		
					4%	15 min		
			STABIMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%	15 min	A(B)(V)	
			ANIOSEPT ACTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.	
	myti přístrojů		SEKUZYME	enzym	0,5%	15 min	------	
	druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý
	vyšší stupeň dezinfekce (VSD)		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý
			KORSOLEX PAA	kyselina peroctová	neředí se	15 min	ABCTMV	
	Odsávačky		INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V)	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	60 min	ABTM(V)	
			ANIOSEPT ACTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
			INCIDIN ACTIVE	peruhličitan disodný	1%	5 min	A(V)	
		potrubí RHB van	SAVAGRO A+	chlornan sodný	0,25%	20 min	A(V)	
			Kyselina amidosulfonová	dle doporučení servisních techniků/pracovníků				
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	30 min	------	teplota vody 40-60°C
Nádobí	nádobí	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	A(B)V	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla TBC=30 min
			DESAM PRIM	chlór	2%	15 min	ABV	
					5%	30 min	ABTMV + Cl. diff	
			DESAM EXTRA	KAS, amin	0,5%	15 min	A(B)T	
					1%	15 min	A(B)TV	
RUCE A POKOŽKA	mytí rukou	pěnové mýdlo	KIMCARE pěnové mýdlo		neředěné, 4 ml			
	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	30 sec./2x1,5min	A(B)TM(V)	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)	
						30 sec	ABTM(V)	
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	20 sec /1,5min	ABTM(V)	pro alergiky
						30 sec	ABTM(V)	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec. /2x1,5min	A(B)TM(V)	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol				
			SEPTODERM SOFT (BAG)	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec. /2x1,5min	A(B)TM(V)	
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec /2x1,5min	ABTM(V)	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	30 sec./2x1,5min	A(B)TM(V)	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	SILONDA	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
			SILONDA LIPID, SENSITIVE					
			BALMEA/BALMEA PROTECT					
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postřikat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TM(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			CITROCLOREX 2% CLEAR (zelená etiketa)	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)TM(V)	remanentní účinek 6 hodin
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)TM(V)	nechat vždy zcela zaschnout
			Braunoderm	alkohol, PVP-jod			A(B)TM(V)	
			CHLORHEXIDIN 2% alcoholic solution barvený	chlorhexidin, alkohol	neředí se	2 min	A(B)(V)	vhodný i na vstupy centrálních žilních katétrů
	Prevence plísní nohou	postřik	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	vhodné pro diabetiky
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (šedá etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TM(V)	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINSAN SCRUB N / FOAM	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sec	cca 3ml	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty
					dekolonizace MRSA	1 min	A(B)(V)	
Sliznice	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)(V)	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENISEPT	octenidinhydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)(V)	
	rány	výplachy a oplachy ran	BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV	

platnost od 1.3.2018