

Dezinfekční plán

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka		
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolky, vozíky, podložní misky, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25 %	30 min	A(B)(V)	stabilita roztoku 28 dní		
					0,5 %	15 min	A(B)(V)			
					1,5%	60 min	A(B)TM(V)			
					2%	60 min	A(B+)TM(V)			
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1 %	15 min	A(B)(V)			
					0,25 %	15 min	A(B)(V)			
					0,5 %	30 min	A(B)TM(V)			
			SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	1 %	60 min	A(B+)TM(V)			
					MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1tbl/1,5 l vody		15 min	ABTM(V) + Cl.diff.
	pro použití s aplikačním systémem Incidin WIPES	otřít ubrouskem	INCIDIN PRO	amin, KAS	0,5% / 1%	30 / 15 min	A(B)(V)			
SURFANIOS PREMIUM			KAS, amin	0,5%	15 min	A(B)(V)				
INCIDIN LIQUID			alkohol	neředí se	5 min	A(B)TM(V)				
INCIDIN OXYFOAM S			peroxid vodíku	neředí se	15 min	A(B+)TMV + Cl.diff.				
Malé plochy	dezinfekce postřikem	nastříkat, rozetřít	INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)T(V)	i pro lesklé povrchy a nerez		
			DESPREJ NEW	alkohol,KAS	neředí se	1 min	A(B)TMV			
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	1 min	A(B)(V)	noro, adeno, SV40		
						15 min	A(B+)TMV + Cl. diff.			
	dezinfekce otěrem	otřít ubrouskem	INCIDIN ALCOHOL WIPE	alkohol	ubrousek	1 min	A(B)T(V)			
						5 min	A(B+)T(V)			
		i UZ sondy,citlivé materiály	BACILLLOL 30 SENSITIVE TISSUES	alkohol	ubrousek	3 min	A(B)TM(V)			
						30 sec	B			
						2 min	AB(V)			
						2 min	AB(V)			
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	ubrousek	5 min	A(B)(V)	adeno, SV40		
			MELISEPTOL WIPES SENSITIVE	KAS, propanol	ubrousek	1 min	A(B)(V)			
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	2 min	A(B)(V)			
						5 min	A(B)TMV			
						15 min	A(B+)TMV			
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	SURFASAFE PREMIUM	amin, alkohol	neředí se	2 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory		
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TM(V)			
		omýt roztokem	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroctová	1 %	15 min	ABTM(V)+Cl.diff.			
			SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0,25%	15 min	A(B)(V)			
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroctová	0,5 %	30 min	ABTM(V)	vhodné i v případě rotavirových a norovirových infekcí		
					0,5 %	60 min	ABCTM(V)			
					1,0 %	15 min	ABTM(V)+Cl.diff.			
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna/incidin wipes premium	15 min	A(B+)TMV + Cl. diff.			
						MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný		1 tbl / 1,5l vody	15 min
			5tbl / 1,5l vody	15 min	ABCTMV					
	ruce	virové nákazy		SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec		ABTM(V)	
			STERILLIUM MED	alkohol	neředí se	30 sec	ABTMV			
Biolog. znečištění	buničinu/Incidin wipes premium smočit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu)		MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1tbl/1,5 l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.			
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna/incidin wipes premium	15 min	A(B+)TMV+Cl.diff			
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	15 min	A(B+)TMV			
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	15 min	ABTM(V) + Cl.diff.	nechat nejlépe přes noc		
Nástroje a přístroje	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku,mýt pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	2 %	15 min	A(B)(V)			
			ANIOSYME XL3	KAS, enzymy	0,5%	15 min	A(B)(V)			
					1 %	30 min	A(B)T(V)			
			DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1 %	15 min	A(B)TM(V)			
			SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	1,5%	60 min	A(B)T(V)			
					2,5%	30 min				
			BOMIX PLUS	KAS	4 %	15 min	A(B)(V)			
					0,5%	15 min				
	druhý stupeň dezinfekce	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	STABIMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%	15 min	A(B)(V)	denně čerstvý		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2 %	30 min	ABCTMV	denně čerstvý		
	vyšší stupeň dezinfekce (VSD)		SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2 %	30 min	ABCTMV			
			ANIOXYDE 1000LD	kyselina peroctová	neředí se	5 min	ABCTMV			
Odsávačky			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25 %	30 min	A(B)(V)			
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličen disodný	2 %	30 min	ABCTMV			
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	ANIOS OXYFLOOR	kyselina peroctová	0,5 %	5 min	A(B)(V)			
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25 %	5 min	A(V)			
			SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0,25 %	15 min	A(B)(V)			
			THERMOSEPT SKS	organické kyseliny	0,30 %	5 min	pravidelné čištění	teplota vody 40-60°C		
		potrubí RHB van	Kyselina amidosulfonová			dle doporučení servisních techniků/pracovníků		teplota vody 40-60°C		
			THERMOSEPT NKP	kys. fosforečná	0,20 %	5 min	pravidelné čištění			
					4,00 %	5 min	při silném znečištění			
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	15 min	ABTV			
			DESAM PRIM	chlór	5tbl / 1,5l vody	15 min	ABCTMV			
					3 %	5 min	AB(V)			
					5 %	30 min	ABCTMV			
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT PLUS	isopropanol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./2x1,5min	A(B)TM(V)	pro alergiky		
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)			
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec	ABTM(V)			
						20 sec./1,5min	ABTM(V)			
			DESDERMAN CARE	etanol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec./1x1,5min	ABTM(V)			
			DESDERMAN CARE GEL	etanol	cca 3ml/2x 5 ml	30 sec./1x1,5min	A(B)TM(V)			
			DESMANOL PURE	isopropanol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./1x1,5min	A(B)TM(V)	pro alergiky, atopiky		
			STERILLIUM	isopropanol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./1x1,5min	A(B)TM(V)			
			STERILLIUM PURE	isopropanol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./1x1,5min	A(B)TM(V)			
			STERILLIUM GEL PURE	etanol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./1x1,5min	ABTMV			
			STERILLIUM MED	alkohol	cca 3ml/2x5ml	30 sec./1x1,5min	ABTMV	plně virucidní, pro citlivou pokožku		
			ANIOSGEL	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec./2x1,5min	ABTM(V)			
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	30 sec./2x1,5min	A(B)T(V)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min		
			SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TM(V)			
			CUTASEPT F	propanol	neředí se	15 s	A(B)T(V)			
			CITROCLOREX 2% CLEAR	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)T(V)	nechat vždy zcela zaschnout		
			SKINSEPT G	alkohol	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)TM(V)			
			CUTASEPT G	propanol	neředí se	min. 15 s /punkce 1 min	A(B)T(V)			
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	CITROCLOREX RED 2%	chlorhexidin diglukonát, ethanol	neředí se	1 min	A(B)(V)	Stabilita barevného roztoku 72 hodiny od namíchání.		
			CHLORHEXIDIN 2% alcoholic solution barvený	chlorhexidin, alkohol	neředí se	1 min	A(B)(V)	vhodný i na vstupy centrálních žilních katétrů		
Katétry			katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)T(V)	
MRSA			dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINSAN 2%	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sec	cca 3ml	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty
	dekolonizace MRSA	1 min					A(B)(V)			
Sliznice	dezinfekce sliznic		OCTENISEPT	octenidinhydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)(V)			